


Rapport de M. fernal
sur les observations de M. Brillard
sur le tétanos.



ARC 49 n° 30



Rapport des observations sur le Tétanos
Communiquées à l'Académie, par M.
Billard son correspondant et Chirurgien
Major du Port et des Hôpitaux de la
marine à Brest.



M. Billard a envoyé quatre obser-
vations sur le tétanos symptomatique,
contre lequel il a employé avec succès
l'Opium à grande dose.

Dans la première, il s'agit d'un Lieute-
nant de vaisseau Anglois, qui ayant eu
le pied gauche emporté ^{par un boulet de canon} dans l'articulation
de l'Astragal et du Calcaneum avec
le Scaphoïde et le Cuboïde, fut saisi
du tétanos le 14^e jour de la blessure.
l'on commença par lui administrer

25 gouttes de teinture anodyne de
lydenham, que l'en augmenta par
gradation jusqu'à soixante; dose qui
a été répétée jusqu'à trois et même
quatre fois dans les 24 heures. L'on
mêla aussi de cette teinture dans le
digestif qui servoit pour le pansement
de la playe. la première prise
excita une douce transpiration, qui fut
soutenue par le moyen de l'infusion
de fleurs de sureau. malgré cette
evacuation favorable, loin de diminuer
le spasme ~~augmentait~~ continuoit,
les ^{muscles} ~~ligaments~~ du col étoient très roides,
la mâchoire serrée, les muscles du bas
ventre durs, les urines se supprimèrent,
et cette roideur universelle dura
plusieurs jours. Sans discontinuer
l'usage de la teinture anodyne, dont

il augmentoit la dose en raison de
l'intensité du spasme, M Billard pour
le faire cesser, fit concourir, retativement
aux circonstances, plusieurs autres remèdes,
tels que le petit lait nitré, les poudres
temperantes camphrées, les minéralisés,
les cataplasmes emollients et les onctions
d'huile camphrée sur le bas ventre.
Les accidents cédèrent de jour en jour
et la mâchoire se desserra le 12^e jour
de l'invasion du tétanos. le malade
fut mis au lait de vache pour toute
nourriture et a été parfaitement rétabli.

Dans la 2^e observation, il est
question d'un matelot, qui ayant eu la
jambe droite emportée par un boulet
de Canon, subit sur le champ l'ampu-
tation de la cuisse à la partie
inférieure. il ne fut transporté à l'Hôpital



de Brett que le 4^e jour. Son extrême
sensibilité détermina à lui administrer
tous les jours depuis 15 jusqu'à 25 gr^{tt}
anodynes. Le 14 au matin, il avoit la
machoire serrée, le col roide, un mal
de tête violent et une oppression
considérable. 50 gr^{tt} anodynes données
sur le champ dissipèrent tous ces
symptômes. une sueur abondante
opéra un relachement salutaire.
on reiterra le soir la mesme dose
de teinture, que l'on ajouta au
digestif, comme dans le cas précédent.
l'en continua de mesme matin et
soir pendant 5 jours, au bout des-
quels, la machoire étant libre,
on retrancha la moitié de la
dose et après on la supprima.

Cet homme étant bien rétabli
la saillie du moignon, obligea d'en
faire la résection. Les mêmes accidents
nerveux, à peu de chose près, se
révèlerent et se dissipèrent avec
le même succès, par l'usage des grand
-es doses d'Opium.

Dans la 3^e, un matelot ayant eu
l'avant-bras droit emporté par un
boulet, l'amputation du bras fut faite
sans délai. Le tétanos survint le
25^e jour. 40 gr^{tt} anodynes données
matin et soir pendant 4 jours, suffirent
pour dissiper le spasme. Le malade
sortit guéri le 66^e jour de sa
blessure.



^{un matelot}
Dans la 4.^e, ayant été blessé
par une balle de mitraille qui lui
avait fracassé l'acromion &c. les
tétanos survint le 16^e jour. on mesla
la teinture aux topiques, et on lui en
fit avaler 25 gouttes de six en six heures.

Le spasme augmentant, l'on
augmenta aussi la dose, l'on
donna du Musc, l'on associa à ces
moyens tous les remèdes tant internes
qu'externes indiqués dans cette circon-
-stance. Comme le spasme ne cedoit
point, que la mâchoire étoit très
fermée et le corps raide comme
un arbre, M. Billard prit le
parti d'administrer l'extract d'opium.

diffout dans l'eau, il voussa les doses
jusqu'à six grains de quatre
en quatre heures, dose que
l'opiniâtreté des symptômes obligea
de continuer long-tems. Après
20 jours de l'invasion du tétanos,
les accidents cessèrent ~~peu à peu~~
et le malade sortit de l'Hôpital
parfaitement guéri.



M. Billard tire de ces 4 observations des
reflexions très-judicieuses relatives à la
pratique dans ces sortes de cas. elles
regardent le débridement des parties
membraneuses, aponeurotiques, la recherche
et l'extraction des corps étrangers qui
peuvent irriter, la section totale des
tendons ou des nerfs piqués ou en

partie

rompus, déchirés, cause d'irritation,
enfin, le régime et l'administration bien
combinée des remèdes internes avec les
topiques. Comme ces moyens se présentent
pour ainsi dire, d'eux mêmes à tout
praticien éclairé, j'ai cru ne devoir
insister, dans le compte que je rends
de ces observations, que sur les doses
d'Opium, qui ont si bien réussi sur les
blessés tétaniques. C'est ce me semble,
ce qui intéresse le plus l'Académie.

Le 1^{er} blessé a pris à forte dose
la teinture anodyne de Hydenham. elle en
a été pousée jusqu'à 240^{gr} en 24 heures.
au rapport de Hydenham 20^{gr} ne tiennent
en dissolution qu'un grain d'Opium. Conséquem-
ment le malade en prenoit 12 grains par
jour: ce qui fait environ 311 en 12 jours.

Le 2^e 100^{gr} par δ = 5^{gr} { et peut être autant
en 5 jours 25 grains { après la résorption
du maignon.

Le 3^e 80^{gr} par jour = 9^{gr} 4.
en 4 jours ~~5~~ 16^{gr} et peut être autant après
la résorption du maignon.



pour le 4^e, je dois remettre sous les yeux
de l'Académie, que le spasme ne cedant
point à 100 ^{grains} de teinture anodyne,
(que l'on fait être l'opium uni au
saffran, à la canelle, aux étoux de Geroffle
et diffout à la dose de 3ii dans une
une chopine de vin d'Espagne) M -
Billard lui substitua la dissolution
dans l'eau, préparation simple, si vantée
par Wedelius dans son ouvrage intitulé
opriologia, par le Mort dans ses collectanea
chymica Leydensia, par Geoffroi dans
sa matière médicale, qu'il lui donnent
la préférence sur toutes les autres
préparations. elle est, selon ces auteurs
plus pure et plus efficace. l'on a rien à
craindre de ce menstrie, et l'opium
de cette manière et non seulement
purifié des parties hétérogènes qu'il
contient; mais encore, il est dépouillé de
la résine. Jean Jones médecin de Londres
fait tant de cas de cette ^{simple} teinture, qu'il lui

donne le nom de panacée. Sans son
traité de la decouverte des Myſteres de
l'opium. j'ai cru pouvoir me permettre
cette digression.

Suivant ~~cette~~ ^{la} 4^e observation, le
tétanos a duré 20 jours. je suppose (car
on ne le dit point) que l'on ait donné
pendant 4 jours, 100^{gr} de teinture de
Hydenham dans les 24 heures. nous
avons dû à 20 grains d'opium
six grains dissouts dans l'eau, ^{donnés} de 4 en 4 heures
font 3℥ par jour.

31 en 16 s.
en ajoutant les 20 grains dissouts dans la
R anodyne, la dose en 20 jours est d'une
once 20^{gr} ou ℥1, ou 3℥, si l'on veut; car
le calcul ne peut être rigoureux.

Les doses données aux trois 1^{ers} blessés,
ne me paroiſſ^{ent} point faire difficulté.
Sans m'arrêter à celles prescrites par
certains auteurs, depuis la plus foible, jusqu'à
la plus forte C. a. D. depuis $\frac{1}{4}$ de grain
jusqu'à six grains, sans tirer au coin

part de celle des Turcs, qui prennent un
gros d'opium et plus pour s'animer au
combat, sans même avoir besoin de recourir
au à l'autorité de Boecler, qui dit dans la
continuation ^{du grand ouvrage qui a pour titre:} Gynœcura materia medica
Hermanniana, que dans l'Inde, on admin-
istre cette substance sans inconvénient à la
dose d'℞i et même d'℥ss, je me contenterai
du témoignage du Docteur Hind. Cet auteur
dans un ouvrage intitulé: essai sur les maladies
qui attaquent les Européens transportés
dans les pays chauds Londres 1768, rapporte
que dans un cas d'opisthotonos, observé
dans l'Hôpital d'Haslar, on donna au
malade ℞i d'extrait thébaïque ou Laudan
um solide, en moins de 24 heures. l'on a fait
convenir l'application de l'opium et du
Camphre sur les pieds. La cessation du spasme
l'en est suivie sur le champ; il a reparu à
l'instant où l'on a levé le topique, et a
celle de nouveau, quand on l'a réappliqué.



Le spasme est ordinaire après les
amputations, continue M. Lind, et il rapporte
que sur six amputés, il en mourut 4 de ce
terrible symptôme pendant la dernière
guerre dans l'Inde. Quant à l'usage interne
de l'opium, ~~l'acte~~^{l'on} a observé qu'il a été
souvent impuissant, pour faire cesser le
spasme, si l'on n'a point été aidé de la forte
application d'une forte dissolution de cette
substance sur les parties blessées, et souvent
sur le siège même du spasme, jus qu'à ce
point de produire une forte de Paralyse.
M. Peyrille qui a bien voulu me communi-
quer le jugement ~~qu'il porte sur l'excellent~~^{et le jugement qu'il en porte}
ouvrage de M. Lind dans son volume futur
de l'Histoire de la Chirurgie, dit, que le livre
renferme une notion succincte, mais
suffisante du spasme et des remèdes dont
on se sert le plus utilement pour le
combattre ou pour s'en préserver.

La 4^e observation paroit plus difficile
à concilier avec nos idées ou plutôt nos
préjugés sur l'administration de l'opium

parce qu'~~heureusement~~^{heureusement} nous vivons dans
des contrées où le spasme est infiniment
rare. néanmoins, si l'on considère,
l'intensité, la durée, l'opiniâtreté de
ce symptôme mortel et l'inutilité des
dozes moindres d'opium dans le 4^e cas,
l'on ne pourra ^{non seulement} l'empêcher de justifier,
^{mais même d'applaudir aux}
~~elles~~ fortes dozes judicieusement administrées
relativement aux circonstances. Le cas
rapporté dans les observations des médecins
de Londres, où l'on dit qu'un tétanique
a pris ^{avec succès} 26 grains d'opium en 24 heures
et plus d'une once en 3 semaines, appuie
la 4^e observation de M. Billard.

Les 4 malades qu'il a sauvés, doivent la vie
à la conduite intelligente et à son heureuse
temerité. j'estime que ses observations très
intéressantes, méritent des remerciements
et un accueil distingué de la part de
l'Académie.

Ferrand
Le 19 août 1809



